

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Светланы Игоревны Савосиной
«Эффективность грудной эпидуральной аналгезии при
анестезиологическом обеспечении радикальных операций у больных
раком прямой кишки», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук, по специальностям 14.01.12 – онкология,
14.01.20 – анестезиология и реаниматология

Проблема лечения больных с колоректальным раком в целом и с опухолевым поражением прямой кишки, в частности, является крайне актуальной в связи с ежегодно увеличивающимися показателями заболеваемости и смертности, обусловленными этой патологией. Помимо неудовлетворительных онкологических результатов лечения, остроту вопроса определяет и высокий уровень послеоперационных осложнений, снижающих качество жизни радикально пролеченных пациентов. В последнее время, в связи с отработкой хирургических приемов радикально изменилась структура послеоперационных осложнений, на первый план выходят соматические осложнения. Существенный вклад в профилактику таких побочных эффектов обеспечивает совершенствование методов анестезиологической защиты во время хирургического вмешательства и обезболивания в раннем послеоперационном периоде. Диссертационная работа С.И. Савосиной посвящена оценке эффективности грудной эпидуральной аналгезии при радикальном хирургическом лечении местнораспространенного рака прямой кишки, что позволяет рассматривать это исследование как актуальное для клинической онкологии.

В исследовании, в сравнительном аспекте, в зависимости от метода использованной методики анестезиологического сопровождения, оценены непосредственные результаты хирургического этапа комбинированного лечения больных с диагнозом рак прямой кишки II-III стадий. Автором достоверно доказано, что использование грудной эпидуральной аналгезии в качестве компонента анестезии снижает уровень побочных эффектов и

